

# Théorie des caractères.

## 1 Exercice 1. *Rappels de cours*

Montrer que :

1. une représentation  $(V, \rho)$  est irréductible si, et seulement si on a  $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$  ;
2. deux représentations  $(V, \rho)$  et  $(V', \rho')$  sont isomorphes si, et seulement si  $\chi_V = \chi_{V'}$ .

1. On procède en deux temps.

- ▷ «  $\implies$  ». Si  $V$  est irréductible alors, par le lemme de Schur, on a  $\dim \text{Hom}_G(V, V) = 1$  et donc

$$\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \dim \text{Hom}_G(V, V) = 1$$

- ▷ «  $\impliedby$  ». Si on écrit  $V = \bigoplus_{k=1}^r W_k^{n_k}$  où  $W_k$  est une représentation irréductible, deux ) deux non isomorphe, et avec  $n_k \geq 1$ . Ainsi,

$$\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \left\langle \chi_V, \sum_{k=1}^r n_k \chi_{W_k} \right\rangle = \sum_{k=1}^r n_k \langle \chi_V, \chi_{W_k} \rangle = \sum_{k=1}^r n_k^2.$$

Or,  $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$  donc  $\sum_{k=1}^r n_k^2 = 1$  avec  $n_k \geq 1$ . On en déduit que  $r = 1$  et  $n_1 = 1$ . Ainsi  $V$  est irréductible.

2. Soient  $(V, \rho)$  et  $(V', \rho')$  deux représentations de  $G$ . On décompose  $V = \sum_{W_k \in \mathcal{F}_G} W_k^{n_k}$  avec les  $W_k$  irréductibles, et deux à deux non isomorphes. Or,  $\langle \chi_V, \chi_{W_k} \rangle = n_k$ .

▷ «  $\implies$  ». Si  $(V, \rho) \cong (V', \rho')$ , alors il existe  $u \in \text{GL}(V, W)$  tel que pour tout  $g \in G$ ,

$$\rho'(g) = u \circ \rho(g) \circ u^{-1}.$$

Ainsi,  $\chi_V(g) = \text{Tr}(\rho(g)) = \text{Tr}(\rho'(g)) = \chi_{V'}(g)$ . On en conclut  $\chi_V = \chi_{V'}$ .

▷ «  $\impliedby$  ». Si  $\chi_V = \chi_{V'}$  alors  $\langle \chi_{V'}, \chi_{W_k} \rangle = n_k$  et donc

$$V' \cong \bigoplus_{W_k \in \mathcal{J}_G} W_k^{n_k} = V.$$

## 2 Exercice 2. Représentation d'une action de groupe

Soit  $G$  un groupe fini agissant sur un ensemble fini  $X$ . On note également  $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_k$  les orbites de  $X$  sous l'action de  $G$ . On définit la représentation associée à cette action de la manière suivante : on pose

$$V_X := \bigoplus_{x \in X} \mathbb{C}e_x,$$

et  $g \in G$  agit sur  $V_X$  par

$$g \cdot \left( \sum_{x \in X} a_x e_x \right) := \sum_{x \in X} a_x e_{g \cdot x}.$$

1. Montrer que  $\chi_{V_X}(g) = \#\{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ .
2. a) Montrer que  $V_X^G$  est engendré par les  $e_{\mathcal{O}_i} := \sum_{x \in \mathcal{O}_i} e_x$ .  
 b) En déduire que le nombre d'orbite de  $X$  est égal à  $\dim(V_X^G)$ .

On suppose que l'action de  $G$  est transitive. La représentation se décompose donc en  $\mathbf{1} \oplus H$  où  $H$  ne contient pas de sous-représentation isomorphe à la représentation triviale.

3. On fait agir  $G$  sur  $X \times X$  de manière diagonale. Montrer que  $\chi_{V_{X \times X}} = \chi_{V_X}$ .

4. On dit que  $G$  agit deux fois transitivement si  $\#X \geq 2$  et pour tous couples  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times X$  avec  $x_1 \neq y_1$  et  $x_2 \neq y_2$  il existe  $g \in G$  tel que  $g \cdot (x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ .

Montrer que  $G$  agit deux fois transitivement si et seulement si l'action  $G \curvearrowright X \times X$  a deux orbites.

5. Montrer que  $G$  agit deux fois transitivement si et seulement si  $\langle \chi_{V_X}^2, \mathbb{1} \rangle = 2$  si et seulement si  $H$  est irréductible.

**Applications :**

6. On prend l'action naturelle de  $\mathfrak{S}_n$  sur  $\llbracket 1, n \rrbracket$ .
- a) Retrouver que  $V_X$  se décompose en une somme de deux représentations irréductibles  $\mathbb{1} \oplus H$ .
  - b) Calculer le caractère de la représentation standard.
7. On prend l'action par translation de  $G$  sur lui-même. Calculer le caractère de la représentation régulière.
1. On considère la base duale  $(e_x^*)_{x \in X}$  de  $(e_x)_{x \in X}$ . Alors, pour tout  $g \in G$ , on a

$$\begin{aligned} \chi_{V_X}(g) &= \text{Tr}(\rho_X(g)) \\ &= \sum_{x \in X} e_x^*(\rho_X(g)(e_x)) \\ &= \sum_{x \in X} e_x^*(e_{g \cdot x}) \\ &= \#\{x \in X \mid g \cdot x = x\}. \end{aligned}$$

2. a) On sait que

$$V_X^G = \{v \in V_X \mid \forall g \in G, g \cdot v = v\}.$$

Or,

$$g \cdot e_{\mathfrak{O}_i} = \sum_{x \in \mathfrak{O}_i} e_{g \cdot x} = \sum_{x \in \mathfrak{O}_i} e_x = e_{\mathfrak{O}_i},$$

donc  $e_{\mathfrak{O}_i} \in V_X^G$ , et donc  $\text{vect}((e_{\mathfrak{O}_i})_i) \subseteq V_X^G$ . Réciproquement, soit  $v \in V_X^G$ . On écrit  $v = \sum_{x \in X} \lambda_x e_x$ . Alors, pour tout élément  $g \in G$ ,  $g \cdot x = x$  donc  $\lambda_{g \cdot x} = \lambda_x$  pour tout

$x \in X$ . Autrement dit, si  $x, y \in \mathcal{O}_i$  alors  $\lambda_x = \lambda_y =: \lambda_{\mathcal{O}_i}$ .  
Donc

$$v = \sum_{x \in X} \lambda_x e_x = \sum_{i=1}^k \lambda_{\mathcal{O}_i} \sum_{x \in \mathcal{O}_i} e_x = \sum_{i=1}^k \lambda_{\mathcal{O}_i} e_{\mathcal{O}_i} \in \text{vect}((e_{\mathcal{O}_i})_i),$$

d'où l'inclusion réciproque et donc l'égalité.

- b)** Les  $(e_{\mathcal{O}_i})$  forment une famille libre car les  $(e_i)$  le sont et car les  $\mathcal{O}_i$  forment une partition de  $X$ . Ainsi,

$$\dim(V_X^G) = \dim \text{vect}((e_{\mathcal{O}_i})_i) = k.$$

- 3.** On fait agir  $G$  sur  $X \times X$  par *action diagonale*, c'est à dire que

$$g \cdot (x, y) := (g \cdot x, g \cdot y).$$

Ainsi, pour  $g \in G$ , par combinatoire,

$$\begin{aligned} \chi_{V_{X \times X}}(g) &= \#\{(x, y) \in X \times X \mid g \cdot (x, y) = (x, y)\} \\ &= (\#\{x \in X \mid g \cdot x = x\})^2 \\ &= (\chi_{V_X}(g))^2. \end{aligned}$$

- 4.** Soit  $D := \{(x, x) \mid x \in X\}$ . C'est une orbite de l'action de  $G$  sur  $X \times X$  par transitivité de l'action  $G \curvearrowright X$ . Ainsi, on a la chaîne d'équivalences suivante :

$G \curvearrowright X \times X$  admet deux orbites



$(X \times X) \setminus D$  est une orbite



$$\forall x_1 \neq y_1, x_2 \neq y_2, \exists g \in G, g \cdot (x_1, x_2) = (x_2, y_2),$$

d'où l'équivalence.

- 5.** On ré-écrit les propriétés étudiées :

- (i)  $G$  agit deux fois transitivement sur  $X$  ;
- (ii)  $\langle \chi_{V_X}^2, \mathbf{1} \rangle = 2$  ;
- (iii)  $H$  irréductible.

▷ « (i)  $\implies$  (ii) »

$$\begin{aligned} \langle \chi_{V_X}^2, \mathbf{1} \rangle &= \langle \chi_{V_{X \times X}}, \mathbf{1} \rangle = \frac{1}{G} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{V_X}(g)} \\ &= \overline{\dim(V_{X \times X}^G)} = \dim(V_{X \times X}^G). \end{aligned}$$

# Table des matières

	<b>Théorie des caractères.</b>	<b>1</b>
1	Exercice 1. <i>Rappels de cours</i> . . . . .	1
2	Exercice 2. <i>Représentation d'une action de groupe</i> . . .	2