CHAPITRE 27

TABLE DES MATIÈRES

I Définitions	2
II Probabilité conditionnelle	4
III Événements indépendants	7

Première partie

Définitions

Définition: Soit Ω un ensemble fini. Une probabilité sur Ω est une application

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1]$$

telle que

1. $P(\Omega) = 1$,
2. $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega), A \cap B = \emptyset \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Dans ce cas, on dit que (Ω, P) est un espace probabilisé.

Définition: Soit (Ω, P) un espace probabilisé.

L'ensemble Ω est appelé univers, les singletons $\{\omega\}$ avec $\omega \in \Omega$ sont appelés événements élémentaires, les parties de Ω sont appelées événements, $\emptyset$ est appelé événement impossible et Ω est appelé événement certain.

Soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$. On dit que A et B sont incompatibles si $A \cap B = \emptyset$.

Proposition: Soit $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ un ensemble de cardinal n et $(p_1, \dots, p_n) \in [0, 1]^n$ tel que $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. Il existe une unique probabilité P sur Ω que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(\{\omega_i\}) = p_i.$$

■

Lemme: Soit P une probabilité sur Ω et $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'événements 2 à 2 incompatibles. Alors

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

■

Proposition: Soit P une probabilité sur Ω .

1. $P(\emptyset) = 0$;
2. $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega), A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$;
3. $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega), P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

■

Deuxième partie

Probabilité conditionnelle

Proposition – Définition: Soit (Ω, P) un espace probabilisé et $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $P(A) \neq 0$.

L'application

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow [0, 1] \\ X &\longmapsto \frac{P(A \cap X)}{P(A)} \end{aligned}$$

est une probabilité. Elle est notée P_A et est appelée probabilité sachant A .

Elle est parfois notée $P(A | B)$. ■

Proposition: Soit (Ω, P) un espace probabilisé et $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $P(A) \neq 0$.

$$\forall X \in \mathcal{P}(\Omega), P(A \cap X) = P(A) P_A(X).$$

□

Proposition: Soit (Ω, P) un espace probabilisé, $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $P(A) \in]0, 1[$.

$$\forall X \in \mathcal{P}(\Omega), P(X) = P(A) P_A(X) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(X).$$

Définition: Soit (Ω, P) un espace probabilisé. Un système complet d'événements est une partition de Ω .

Proposition (probabilités totales): Soit (Ω, P) un espace probabilisé, $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système complet d'événements tel que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(A_i) > 0.$$

Alors,

$$\forall x \in \mathcal{P}(\Omega), P(X) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(X).$$

■

Proposition (probabilités composées): Soit (Ω, P) un espace probabilisé, $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ des événements tels que

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0.$$

Alors,

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \cdots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

Proposition (Bayes): Soit (Ω, P) un espace probabilisé, $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \in]0, 1[$.

$$P_A(B) = \frac{P_B(A) P(B)}{P(A)} = \frac{P_B(A) P(B)}{P_B(A) P(B) + P_{\bar{B}}(A) P(\bar{B})}.$$

□

REMARQUE:

On appelle $P_A(B)$ la vraisemblance (*likelihood* en anglais), $P(A)$ la probabilité a-priori (*prior distribution*), et $P_B(A)$ la probabilité a-posteriori (*posterior distribution*).

Proposition (Bayes): Soit (Ω, P) un espace probabilisé et $(A_k)_{k \in K}$ un système complet d'événements tel que

$$\forall k \in K, P(A_k) \neq 0.$$

Soit $X \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $P(X) \neq 0$. On a

$$\forall k \in K, P_X(A_k) = \frac{P_{A_k}(X) P(A_k)}{\sum_{j \in K} P_{A_j}(X) P(A_j)}.$$

□

Troisième partie

Événements indépendants

Définition: Soient A et B deux événements d'un espace probabilisé (Ω, P) . On dit que A et B sont indépendants si

$$P(A \cap B) = P(A) P(B).$$

REMARQUE:

L'indépendance d'événements au sens mathématique n'est pas la même chose que l'indépendance dans le sens commun : elle dépend de la probabilité utilisé !

Définition: Soit (Ω, P) un espace probabilisé et $(A_i)_{i \in I}$ une famille finie d'événements.

1. On dit que ces événements sont 2 à 2 indépendants si

$$\forall i \neq j, \quad P(A_i \cap A_j) = P(A_i) P(A_j)$$

2. On dit qu'ils sont mutuellement indépendants si

$$\forall J \in \mathcal{P}(I) \setminus \{\emptyset\}, \quad P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j).$$

Proposition: Soit (Ω, P) un espace probabilisé et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'événements mutuellement indépendants. Soit $J \in \mathcal{P}(I)$ et on pose

$$\forall i \in I, \quad B_i = \begin{cases} \bar{A}_i & \text{si } i \in J \\ A_i & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors, $(B_i)_{i \in I}$ est une famille d'événements mutuellement indépendants. ■