CHAPITRE 26

Déterminant

Hugo SALOU MP2I

Dernière mise à jour le 14 juin 2022

TABLE DES MATIÈRES

I	Motivation	2
II	Définitions	5
III	Déterminant d'un endomorphisme	10
IV	Déterminant d'une matrice carrée	13
V	Développement suivant une ligne ou une colonne	18

Première partie

Motivation

Soit E un espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Soit $\mathcal{C} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille de E . On souhaite trouver un "calcul" sur les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{C}$ qui nous dira si $\mathcal{C}$ est une base ou non de E .

EXEMPLE:

Avec $E = \mathbb{R}^2$, $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ base canonique de $\mathbb{R}^2$, $\mathcal{C} = (u_1, u_2)$ avec $u_1 = (x, y)$ et $u_2 = (x', y')$.

On note A l'aire orientée (ou algébrique) du parallélogramme engendré par u_1 et u_2 .

Cette aire vérifie :

$$\begin{cases} A(u_1 + u_3, u_2) = A(u_1, u_2) + A(u_3, u_2) \\ A(\lambda u_1, u_2) = \lambda A(u_1, u_2) \\ A(u_2, u_1) = -A(u_1, u_2) \\ A(e_1, e_2) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} A(u_1, u_2) &= A(xe_1 + ye_2, u_2) \\ &= xA(e_1, u_2) + yA(e_2, u_2) \\ &= xA(e_1, x'e_1 + y'e_2) + yA(e_2, x'e_1 + y'e_2) \\ &= xx'A(e_1, e_1) + xy'A(e_1, e_2) + yx'A(e_2, e_1) + yy'A(e_2, e_2) \\ &= xy' - yx' \end{aligned}$$

$$(u_1, u_2) \text{ base de } \mathbb{R}^2 \iff xy' - yx' \neq 0$$

REMARQUE:

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = \begin{pmatrix} x & x' \\ y & y' \end{pmatrix}$$

EXEMPLE:

$E = \mathbb{R}^3$, (e_1, e_2, e_3) base canonique, $\mathcal{C} = (u_1, u_2, u_3)$ famille de E .

Soit V le volume algébrique du parallélépipède orienté engendré par u_1 , u_2 et u_3 .

V est trilinéaire et

$$\begin{cases} V(u_2, u_1, u_3) = -V(u_1, u_2, u_3) \\ V(u_3, u_1, u_2) = V(u_1, u_2, u_3) \\ V(e_1, e_2, e_3) = 1 \end{cases}$$

$$\text{On pose } \begin{cases} u_1 = (x_1, y_1, z_1) \\ u_2 = (x_2, y_2, z_2) \\ u_3 = (x_3, y_3, z_3). \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V(u_1, u_2, u_3) &= V(x_1 e_1 + y_1 e_2 + z_1 e_3, u_2, u_3) \\ &= x_1 V(e_1, u_2, u_3) + y_1 V(e_2, u_2, u_3) + z_1 V(e_3, u_2, u_3) \\ &= x_1 y_2 z_3 V(e_1, e_2, e_3) + x_1 z_2 y_3 V(e_1, e_3, e_2) + y_1 x_2 z_3 V(e_2, e_1, e_3) \\ &\quad + y_1 z_2 x_3 V(e_2, e_3, e_1) + z_1 x_2 y_3 V(e_3, e_1, e_2) + z_1 y_2 x_3 V(e_3, e_2, e_1) \\ &= x_1 y_2 z_3 + y_1 z_2 x_3 + z_1 x_2 y_3 - x_1 z_2 y_3 - y_1 x_2 z_3 - z_1 y_2 x_3 \end{aligned}$$

C'est la formule de Sarrus (hors-programme).

Deuxième partie

Définitions

Définition: Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n < +\infty$ et $f : E^n \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que f est multilinéaire si

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall (u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_n) \in E^{n-1},$$

$$\text{l'application } \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ u & \longmapsto & f(u_1, \dots, u_{i-1}, u, u_{i+1}, \dots, u_n) \end{array} \text{ est linéaire.}$$

On dit que f est antisymétrique si

$$\begin{aligned} & \forall i < j, \forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \\ & f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_j, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_i, u_{j+1}, \dots, u_n) \\ & = -f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_j, u_{j+1}, \dots, u_n). \end{aligned}$$

On dit que f est alternée si

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, (\exists i < j, u_i = u_j \implies f(u_1, \dots, u_n) = 0).$$

Proposition: Soit $\mathbb{K}$ un corps tel que $1+1 \neq 0$, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $f : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ une forme multilinéaire.

Alors,

$$f \text{ alternée} \iff f \text{ antisymétrique.}$$

Preuve: “ $\implies$ ” On suppose f alternée.

Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ et $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ avec $i < j$.

$$\begin{aligned} 0 &= f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i + u_j, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_i + u_j, u_{j+1}, \dots, u_n) \\ &= f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_i + u_j, u_{j+1}, \dots, u_n) \\ &\quad + f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_j, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_i + u_j, u_{j+1}, \dots, u_n) \\ &= f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_i, u_{j+1}, \dots, u_n) \\ &\quad + f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_j, u_{j+1}, \dots, u_n) \\ &\quad + f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_j, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_i, u_{j+1}, \dots, u_n) \\ &\quad + f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_j, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_j, u_{j+1}, \dots, u_n) \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} & f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_j, u_{i+1}, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_i, u_{j+1}, \dots, u_n) \\ & = -f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_j, u_{j+1}, \dots, u_n). \end{aligned}$$

Donc, f est antisymétrique.

“ $\impliedby$ ” On suppose f antisymétrique. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ et $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tels que $i < j$ et $u_i < u_j$.

$$\begin{aligned} & f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_j, u_{j+1}, \dots, u_n) \\ & = f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_j, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_i, u_{j+1}, \dots, u_n) \\ & = -f(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_j, u_{j+1}, \dots, u_n) \end{aligned}$$

D'où,

$$f(u_1, \dots, u_n) \underbrace{(1+1)}_{\neq 0} = 0$$

donc $f(u_1, \dots, u_n) = 0$.

□

Dans le reste du chapitre, $\mathbb{K}$ est un corps avec $1 + 1 \neq 0$.

Théorème: Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . L'ensemble des formes multilinéaires alternées de E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{(E^n)}$ de dimension 1.

Preuve (pas exigible):

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit f une forme multilinéaire alternée. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$.

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \exists (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n}, u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

$$\begin{aligned} f(u_1, \dots, u_n) &= f\left(\sum_{i=1}^n a_{i,1} e_i, u_2, \dots, u_n\right) \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,1} f(e_i, u_2, \dots, u_n) \\ &= \sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} f\left(e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^n a_{i_2,2} e_{i_2}, u_3, \dots, u_n\right) \\ &= \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n a_{i_1,1} a_{i_2,2} f(e_{i_1}, e_{i_2}, u_3, \dots, u_n) \\ &\vdots \\ &= \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_n=1}^n a_{i_1,1} a_{i_2,2} \cdots a_{i_n,n} f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n} f(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(n)}) \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \underbrace{\left(\varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}\right)}_{A(u_1, \dots, u_n)} \underbrace{f(e_1, \dots, e_n)}_{\in \mathbb{K}} \end{aligned}$$

D'où, $f = f(e_1, \dots, e_n) A$.

Donc, l'ensemble des formes multilinéaires alternées est $\text{Vect}(A)$. De plus,

$$\begin{aligned} A(e_1, \dots, e_n) &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n \delta_{\sigma(j), j} \\ &= \varepsilon(\text{id}) \prod_{j=1}^n 1 = 1 \neq 0. \end{aligned}$$

□

Définition: Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Il existe une unique forme f multilinéaire alternée sur E telle que $f(e_1, \dots, e_n) = 1$. Elle est donnée par la formule

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, f(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j), j}$$

où

$$\forall i, j, a_{i, j} \text{ est la } i\text{-ème coordonnée de } u_j \text{ dans la base } \mathcal{B}.$$

Cette application est appelée déterminant dans la base $\mathcal{B}$ et noté $\det_{\mathcal{B}}$.

Proposition: Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{C} = (u_1, \dots, u_n)$ deux bases de E . Alors

$$\det_{\mathcal{C}} = \det_{\mathcal{C}}(e_1, \dots, e_n) \det_{\mathcal{B}}$$

i.e.

$$\forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n, \det_{\mathcal{C}}(v_1, \dots, v_n) = \det_{\mathcal{C}}(e_1, \dots, e_n) \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n).$$

Preuve:

On sait que $\det_{\mathcal{B}}$ et $\det_{\mathcal{C}}$ sont colinéaires :

$$\exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n, \det_{\mathcal{C}}(v_1, \dots, v_n) = \lambda \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n).$$

En particulier,

$$\det_{\mathcal{C}}(e_1, \dots, e_n) = \lambda \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = \lambda.$$

□

REMARQUE (notation):

Avec les notations précédentes, on note $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$ au lieu de $\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n)$.

Corollaire: Avec les notations précédentes, $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) \neq 0$ et

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = (\det_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}))^{-1}$$

Preuve:

On sait que

$$\forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n, \det_{\mathcal{C}}(v_1, \dots, v_n) = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n).$$

En particulier,

$$1 = \det_{\mathcal{C}}(\mathcal{C}) = \det_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}).$$

□

Théorème: Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $\mathcal{C} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille liée (i.e. $\mathcal{C}$ n'est pas libre). Alors $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = 0$.

Preuve:

Sans perte de généralité, on peut supposer que $u_n \in \text{Vect}(u_1, \dots, u_{n-1})$:

$$u_n = \sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k u_k \text{ où } \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{K}.$$

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_{n-1}, u_n) &= \sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k \underbrace{\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_{n-1}, u_k)}_{=0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

Troisième partie

Déterminant d'un endomorphisme

Proposition: Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors,

$$\exists! \lambda \in \mathbb{K}, \forall (u_1, \dots, u_n) \in E, \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n).$$

Preuve:

$$\text{Soit } g : \begin{array}{ccc} E^n & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ (u_1, \dots, u_n) & \longmapsto & \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_n)) \end{array} . g \text{ est clairement alternée.}$$

Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $(u_1, \dots, u_i, u_{i+1}, \dots, u_n) \in E^{n-1}$. L'application $u \mapsto g(u_1, \dots, u_{i-1}, u, u_{i+1}, \dots, u_n)$ est la composée de f et de $v \mapsto \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_{i-1}), v, f(u_{i+1}), \dots, f(u_n))$ donc elle est linéaire.

Donc, g est une forme multilinéaire alternée donc colinéaire à $\det_{\mathcal{B}}$. $\square$

Proposition: Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ deux bases de E . Soient $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ tel que

$$\forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \begin{cases} \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n), \\ \det_{\mathcal{C}}(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \mu \det_{\mathcal{C}}(u_1, \dots, u_n). \end{cases}$$

Alors, $\lambda = \mu$.

Preuve:

On pose $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$.

$$\det_{\mathcal{C}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) = \mu \det_{\mathcal{C}}(e_1, \dots, e_n) = \mu \det_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$$

$\parallel$

$$\det_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n))$$

$\parallel$

$$\lambda \underbrace{\det_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})}_{\neq 0} \underbrace{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B})}_{=1}$$

donc $\lambda = \mu$. $\square$

Définition: Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Le déterminant de f est le seul scalaire vérifiant,

$$\forall \mathcal{B} \text{ base de } E, \forall (u_1, \dots, u_n), \det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n)$$

et on le note $\lambda = \det(f)$.

REMARQUE:

Si $n = 2$,

$$\text{Aire}(f(u_1), f(u_2)) = \det(f) \text{Aire}(u_1, u_2).$$

Proposition: Soient f et g deux endomorphismes de E . Alors,

$$\det(f \circ g) = \det f \times \det g.$$

Preuve:

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

$$\det_{\mathcal{B}}(f \circ g(e_1), \dots, f \circ g(e_n)) = \det(f \circ g) \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = \det(f \circ g)$$

||

$$\det_{\mathcal{B}}(f(g(e_1)), \dots, f(g(e_n)))$$

||

$$(\det f) \det_{\mathcal{B}}(g(e_1), \dots, g(e_n))$$

||

$$(\det f) (\det g) \underbrace{\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n)}_{=1}.$$

□

Corollaire: Si $f \in \text{GL}(E)$, alors $\det(f) \neq 0$ et $\det(f^{-1}) = \det(f)^{-1}$.

Preuve:

On suppose $f \in \text{GL}(E)$:

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_E.$$

Donc,

$$\det(f) \det(f^{-1}) = \det(f \circ f^{-1}) = \det(\text{id}_E).$$

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

$$\det_{\mathcal{B}}(\text{id}_E(e_1), \dots, \text{id}_E(e_n)) = \det(\text{id}_E) \times 1$$

||

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$$

□

Proposition: Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose $f \notin \text{GL}(E)$. Alors $\det(f) = 0$.

Preuve:

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)).$$

f n'est pas surjective donc $\text{rg}(f(e_1), \dots, f(e_n)) < n$ donc $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est liée donc $\det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) = 0$. □

Quatrième partie

Déterminant d'une matrice carrée

Définition: Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Le déterminant de A est

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}$$

Proposition: Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n)$.

Alors,

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \det(A).$$

Proposition: Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $f \in \mathcal{L}(E)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$. Alors, $\det(A) = \det(f)$.

Preuve:

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)), \quad A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)).$$

$$\begin{aligned} \det A &= \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) \\ &= \det(f). \end{aligned}$$

□

Proposition: Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$.

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

Preuve:

Soit $E = \mathbb{K}^n$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de E , $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ et $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(g)$.

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(f \circ g) = (\det f) (\deg g) \\ &= \det(A) \det(B). \end{aligned}$$

□

Proposition: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det(A) \neq 0$$

Dans ce cas, $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$. □

Proposition:

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det({}^t A) = \det(A).$$

Preuve:

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$\begin{aligned} \det({}^t A) &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{j, \sigma(j)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma^{-1}(k), k} \\ &= \sum_{\sigma' \in S_n} \varepsilon(\sigma'^{-1}) \prod_{k=1}^n a_{\sigma'(k), k} \\ &= \sum_{\sigma' \in S_n} \varepsilon(\sigma') \prod_{k=1}^n a_{\sigma'(k), k} \\ &= \det(A) \end{aligned}$$

car

$$\begin{aligned} \forall \sigma' \in S_n, \varepsilon(\sigma'^{-1}) &= \varepsilon(\sigma')^{-1} = \begin{cases} 1 & \text{si } \varepsilon(\sigma') = 1 \\ -1 & \text{si } \varepsilon(\sigma') = -1 \end{cases} \\ &= \varepsilon(\sigma'). \end{aligned}$$

□

Proposition: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, C une opération sur les colonnes et A' la matrice obtenue en appliquant C sur les colonnes A .

1. Si $C = c_i \leftrightarrow c_j$ (avec $i \neq j$), alors $\det(A') = -\det(A)$.
2. Si $C = c_i \leftrightarrow \lambda c_i$, alors $\det(A') = \lambda \det(A)$.
3. Si $C = c_i \leftrightarrow c_i + \lambda c_j$ (avec $i \neq j$), alors $\det(A') = \det(A)$.

Preuve:

Soit $(u_1, \dots, u_n) \in (\mathbb{K}^n)^n$ tel que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, c_i = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_i)$$

où $\mathcal{B}$ est la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et c_i la i -ème colonne de A .

1.

$$\begin{aligned}
 -\det(A) &= -\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) \\
 &\quad \parallel \\
 \det(A') &= \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_{i-1}, u_j, u_{i+1}, \dots, u_{j-1}, u_i, u_{j+1}, \dots, u_n).
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 \det(A') &= \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_{i-1}, \lambda u_i, u_{i+1}, \dots, u_n) \\
 &= \lambda \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \dots, u_n) \\
 &= \lambda \det(A).
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 \det(A') &= \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i + \lambda u_j, u_{i+1}, \dots, u_n) \\
 &= \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \dots, u_n) + \lambda \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_{i-1}, u_j, u_{i+1}, \dots, u_n) \\
 &= \det(A)
 \end{aligned}$$

car, comme u_j apparaît deux fois dans le second déterminant, il vaut 0.

□

Corollaire: Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.

Preuve:

Soit $T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ (0) & & & * \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$. S'il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, avec $\lambda_i = 0$, alors $\text{rg}(T) < n$ et

donc $T \notin \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et donc $\det(T) = 0 = \prod_{k=1}^n \lambda_k$.

On suppose que $\forall i, \lambda_i \neq 0$. On a

$$\frac{1}{\lambda_1} \det(T) = \det \begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

et

$$\frac{1}{\lambda_1 \lambda_2} \det(T) = \det \begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & \cdots & * \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & 0 & \lambda_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

D'où

$$\begin{aligned} \frac{1}{\lambda_1 \cdots \lambda_n} \det(T) &= \begin{vmatrix} 1 & & & * \\ & \ddots & & \\ & & (0) & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & (0) \\ & & (0) & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \end{aligned}$$

donc $\det(T) = \lambda_1 \cdots \lambda_n$. □

Proposition: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, L une opération sur les lignes, A' la matrice obtenue en appliquant L sur les lignes de A .

1. Si $L = \ell_i \longleftrightarrow \ell_j$ (avec $i \neq j$), $\det(A') = -\det(A)$.
2. Si $L = \ell_i \longleftrightarrow \lambda \ell_i$, $\det(A') = \lambda \det(A)$.
3. Si $L = \ell_i \longleftrightarrow \ell_i + \lambda \ell_j$ (avec $i \neq j$), $\det(A') = \det(A)$.

□

EXEMPLE:
 $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & a & c \\ c & a & b \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a+b+c & b & c \\ a+b+c & a & c \\ a+b+c & a & b \end{vmatrix} \\ &= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & a & c \\ 1 & a & b \end{vmatrix} \\ &= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & b-c \end{vmatrix} \\ &= (a+b+c)(a-b)(b-c) \end{aligned}$$

Cinquième partie

Développement suivant une ligne ou une colonne

EXEMPLE:

$$\begin{vmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & -1 \\ 7 & 8 & 9 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 4 & 6 & -1 \\ 7 & 9 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 7 & 9 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} - 8 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 4 & 6 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 4 & 6 & -1 \\ 7 & 9 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & -1 \\ 7 & 8 & 9 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & -1 \\ 7 & 8 & 9 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 6 & -1 \\ 8 & 9 & -1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 4 & 6 & -1 \\ 7 & 9 & -2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & -1 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

$E = \mathbb{C}^4$ et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ base canonique de E .

On pose $\begin{cases} u_1 = (1, 4, 7, 3), \\ u_2 = (2, 5, 8, 2), \\ u_3 = (3, 6, 9, 1), \\ u_4 = (0, -1, -2, 0). \end{cases}$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, u_3, u_4) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_1, 2e_1 + 5e_2 + 8e_3 + 2e_4, u_3, u_4)$.

Donc,

$$\begin{aligned} \det A &= \det_{\mathcal{B}}(u_1, 2e_1 + 5e_2 + 8e_3 + 2e_4, u_3, u_4) \\ &= 2 \det_{\mathcal{B}}(u_1, e_1, u_3, u_4) \\ &\quad + 5 \det_{\mathcal{B}}(u_1, e_2, u_3, u_4) \\ &\quad + 9 \det_{\mathcal{B}}(u_1, e_3, u_3, u_4) \\ &\quad + 2 \det_{\mathcal{B}}(u_1, e_4, u_3, u_4). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(u_1, e_1, u_3, u_4) &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 6 & -1 \\ 7 & 0 & 9 & -2 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & -1 \\ 0 & 7 & 9 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & -1 \\ 0 & 7 & 9 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \dots \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & & 0 & \\ & & & * \\ 0 & & & \\ & & & (0) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Idem pour e_2, e_3, e_4 .

Proposition (Laplace): Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} m_{i,j}$$

où $m_{i,j}$ est le mineur d'indices (i, j) , i.e. le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j de la matrice A .

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} m_{i,j}.$$

□

Proposition (Vandermonde): Soient $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$.

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{j < i} (a_j - a_i)$$

Preuve (par récurrence sur n): — Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $a_1, \dots, a_{n+1} \in \mathbb{K}$. On pose

$$\Delta_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_{n+1} & \cdots & a_{n+1}^n \end{vmatrix}$$

On développe Δ_{n+1} suivant la dernière ligne et on obtient une expression polynomiale en a_{n+1} :

$$\Delta_{n+1} = P(a_{n+1}) \text{ avec } P \in \mathbb{K}_n[X]$$

et le coefficient devant X^n est Δ_n .

CAS 1 On suppose $\Delta_n \neq 0$. D'après l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{cases} \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, i \neq j \implies a_i \neq a_j \\ \text{dom}(P_n) = \Delta_n = \prod_{n \geq j > i \geq 1} (a_j - a_i) \\ \text{deg}(P_n) = n \\ \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(a_i) = 0 \end{cases}$$

donc

$$P = \Delta_n (X - a_1) \cdots (X - a_n)$$

donc

$$\begin{aligned} \Delta_{n+1} &= \prod_{n \geq j > i \geq 1} (a_j - a_i) (a_{n+1} - a_1) \cdots (a_{n+1} - a_n) \\ &= \prod_{n+1 \geq j > i \geq 1} (a_j - a_i) \end{aligned}$$

CAS 2 On suppose $\Delta_n = 0$:

$$\exists i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, i \neq j \text{ et } a_i = a_j.$$

Alors,

$$\Delta_{n+1} = 0 = \prod_{n+1 \geq j > i \geq 1} (a_j - a_i).$$

□

Proposition – Définition: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et $\text{com}(A)$ la comatrice de A : c'est la matrice

$$\left((-1)^{i+j} m_{i,j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$$

où $m_{i,j}$ est le mineur d'indices (i, j) de A .

On a

$$A {}^t\text{com}(A) = {}^t\text{com}(A) A = \det(A) I_n.$$

Si $\det A \neq 0$, alors

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t\text{com}(A).$$

EXEMPLE:

Avec $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, on a $\det A = ad - bc$.

$$\text{com } A = \begin{pmatrix} +d & -b \\ -c & +a \end{pmatrix} \text{ donc } {}^t\text{com}(A) = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

Si $\det(A) \neq 0$,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

EXEMPLE:

Avec $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$, on a

$$\text{com } A = \begin{pmatrix} b_2c_3 - b_3c_2 & a_3c_2 - a_2c_3 & a_2b_3 - a_3b_2 \\ c_1b_3 - b_1c_3 & a_1c_3 - a_3c_1 & a_3b_1 - a_1b_3 \\ b_1c_2 - b_2c_1 & a_2c_1 - a_1c_2 & a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}$$

Preuve:

On note $C = A {}^t\text{com}(A) = (c_{i,j})$.

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, c_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} m_{ij} = \det(A).$$

Soient $i \in \llbracket 1, n \rrbracket, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $i \neq j$.

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} (-1)^{j+k} m_{jk}.$$

C'est le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la j -ème ligne de A par la i -ème, qui a donc 2 lignes identiques donc $c_{ij} = 0$.

L'autre formule " ${}^t\text{com}(A) A = \det(A) I_n$ " se démontre de la même façon. □

REMARQUE:

En pratique, on n'utilise jamais cette formule pour trouver A^{-1} (sauf si $n = 2$).

EXERCICE (Formules de Cramer):

INUTILES ET HORS-PROGRAMME

Soit S le système $AX = B$ avec $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

L'unique solution du système S est donnée par

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ où } \forall i, x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$$

où A_i est obtenue en remplaçant la i -ème colonne de A par B .

Solution : Soit $(x_1, \dots, x_n)$ l'unique solution de S .

$$\sum_{i=1}^n x_i C_i(A) = B$$

où $C_i(A)$ est la i -ème colonne de A .

$$\begin{aligned} \forall j, \det(A_j) &= \det(C_1(A), C_2(A), \dots, C_{j-1}(A), B, C_{j+1}(A), \dots, C_n(A)) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \det(C_1(A), \dots, C_{j-1}(A), C_i(A), C_{j+1}(A), \dots, C_n(A)) \\ &= x_j \det(A) \end{aligned}$$

Retour sur la diagonalisation

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On cherche $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$P A P^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & (0) & \\ & & & \ddots \\ & & (0) & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = A$ où $\mathcal{B}$ est la base canonique de $\mathbb{K}^n$. On cherche $\mathcal{C} = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{K}^n$ telle que

$$\exists \lambda_i, f(u_i) = \lambda_i u_i$$

$$\begin{aligned} &\exists \lambda \in \mathbb{K}, \exists u \neq 0, f(u) = \lambda u \\ \iff &\exists \lambda \in \mathbb{K}, \exists u \neq 0, u \in \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_{\mathbb{K}^n}) \\ \iff &\exists \lambda \in \mathbb{K}, f - \lambda \text{id}_{\mathbb{K}^n} \text{ n'est pas injective} \\ \iff &\exists \lambda \in \mathbb{K}, f - \lambda \text{id}_{\mathbb{K}^n} \notin \text{GL}(\mathbb{K}^n) \\ \iff &\exists \lambda \in \mathbb{K}, \det(\lambda - \text{id}_{\mathbb{K}^n}) = 0 \\ \iff &\exists \lambda \in \mathbb{K}, \underbrace{\det(A - \lambda I_n)}_{\text{polynôme caractéristique de } A} = 0 \end{aligned}$$